

Tabella 1. Indicatori di appropriatezza prescrittiva e aderenza al trattamento nel trattamento della bronco-pneumopatia cronico ostruttiva

Indicatore	Valore attuale	Andamento temporale	Valore tendenziale
Percentuale di pazienti con esacerbazioni in trattamento con farmaci indicati per la BPCO (Indicatore H-DB – BPCO 1a)	63%	Costante	100%
Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci per la BPCO senza accertamento spirometrico e/o esenzione per BPCO (Indicatore H-DB – BPCO 1b)	80%	Lieve miglioramento	0%
Percentuale di pazienti in trattamento con SABA in monoterapia (Indicatore H-DB – BPCO 1c)	0%	Costante	-
Percentuale di pazienti in trattamento con ICS in monoterapia (Indicatore H-DB – BPCO 1d)	54%	Costante	0%
Percentuale di pazienti in trattamento con antileucotrieni (Indicatore H-DB – BPCO 1e)	1%	Costante	-
Percentuale di pazienti con esacerbazioni in trattamento con duplice terapia (Indicatore H-DB – BPCO 2a)	36%	In peggioramento	100%
Percentuale di pazienti in trattamento con ICS senza esacerbazioni (Indicatore H-DB – BPCO 2b)	97%	Costante	0%
Percentuale di pazienti in trattamento con duplice/triplice terapia senza passaggio dalla monoterapia o dalla duplice (Indicatore H-DB – BPCO 2c)	96%	Costante	0%
Percentuale di pazienti in trattamento con triplice terapia senza esacerbazioni per 6 mesi che non tornano alla duplice terapia (Indicatore H-DB – BPCO 2d)	34%	Costante	0%
Percentuale di pazienti aderenti al trattamento (Indicatore H-DB – BPCO 3a)	27%	Lieve Miglioramento	100%

Percentuale di pazienti occasionali al trattamento (Indicatore H-DB – BPCO 3b)	41%	Costante	0%
---	-----	----------	----

Figura 1. Prospettive per l'equilibrio tra appropriatezza prescrittiva e sostenibilità economica nell'uso dei farmaci: le aree di sotto- e sovra-utilizzo e la relazione tra miglioramento dell'appropriatezza e variazione della spesa farmaceutica*

