

DICHIARAZIONE ANAMNESTICA
PER USO DEI MEZZI DI CONTRASTO IODATI PER VIA INIETTIVA

SI DICHIARA CHE il/la Sig./Sig.ra

nato/a a..... il

NON PRESENTA I SEGUENTI PARTICOLARI ANAMNESTICI:

Presenza di condizioni patologiche che possano favorire l'insorgenza di reazioni collaterali di tipo medio-grave in seguito all'introduzione di un mezzo di contrasto

- Paraproteinemia di Waldenstrom
- Insufficienza epatica o renale grave
- Mieloma multiplo
- Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria
- Ipertireosi
- Ipersensibilità allo iodio
- Insufficienza renale moderata o grave

Presenza di rilievi anamnestici di natura allergica:

- Precedenti reazioni di tipo anafilattico
- Asma bronchiale
- Dermatiti allergiche da contatto
- Reazione agli antibiotici betalattamici
- Allergia alimentare
- Altre forme atopiche

Stato di gravidanza

PRESENTA I SEGUENTI PARTICOLARI ANAMNESTICI:

Presenza di condizioni patologiche che possano favorire l'insorgenza di reazioni collaterali di tipo medio-grave in seguito all'introduzione di un mezzo di contrasto

- Paraproteinemia di Waldenstrom
- Insufficienza epatica o renale grave
- Mieloma multiplo
- Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria
- Ipertireosi
- Ipersensibilità allo iodio
- Insufficienza renale moderata o grave

Presenza di rilievi anamnestici di natura allergica:

- Precedenti reazioni di tipo anafilattico
- Asma bronchiale
- Dermatiti allergiche da contatto
- Reazione agli antibiotici betalattamici
- Allergia alimentare
- Altre forme atopiche

per cui si è prescritto

Cetirizina cpr 10 mg	1 cpr la sera prima	1 cpr la mattina dell'esame
Betametazone cpr 0,5 mg	2 cpr la sera prima	2 cpr la mattina dell'esame
Ranitidina cpr 150 mg	1 cpr la sera prima	1 cpr la mattina dell'esame

Stato di gravidanza

N.B.: In presenza di pazienti con sospetto clinico di patologia epatica, cardiaca, renale o mielomatosa, è indicato procedere ai seguenti accertamenti: creatininemia, elettroforesi delle sieroproteine (rapporto Kappa/Lambda) o determinazione della proteinuria di Bence Jones, transaminasemia e bilirubinemia.

E' consigliabile l'astensione dalla somministrazione di principi attivi della classe dei biguanidi nelle 48 ore precedenti e successive alla somministrazione di mezzo di contrasto per via endovasale.

Data.....

IL PAZIENTE

IL MEDICO CURANTE